MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENF. RESPIRATORIAS
ENFOQUE PRACTICO EN SALUD PULMONAR (PAL)

GUIA DE ATENCION A ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

1ª VERSIÓN
2005

GUIAS DE ATENCION A ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION

Síntoma(s) dominante(s)	Criterios simples de diagnóstico y clasificación	Tratamiento recomendado
Nariz congestionada o tapada con rinorrea acuosa	Menos de 2 semanas Coriza, Rinitis aguda	Aplicar SSN y Observación
	Más de 2 semanas Rinitis alérgica	Loratadina oral
Dolor a la presión de los senos faciales	Sin fiebre Sinusitis simple	Acetaminofen por 5 días
	Con fiebre y rinorrea purulenta Sinusitis supurada	Amoxicilina o trimetropim durante 7 días Referir a otorrino si los síntomas persisten más de 2 semanas.
Dolor de garganta	Garganta y/o amígdalas eritematosas, Temperatura < 38 °C Sin Ganglios linfáticos del cuello crecidos y dolorosos Faringitis o amigdalitis viral	Acetaminofen * Si síntomas ► 3 días : Amoxicilina oral por 5 días. Si alergia Eritromicina 5 días.
	Con Ganglios linfáticos del cuello crecidos y dolorosos Congestión e hipertrofia de amígdalas con exudado Blanco, Temperatura > 38° Faringoamigdalitis bacteriana	Benzilpenicilina Benzatínica , vía intramuscular. Si alergia a la penicilina, Eritromicina durante 7 días.
	Malestar general Membranas blanco-grisáceas adherentes extensas Adenopatías cervicales voluminosas y dolorosas Fiebre más de 39° C Presunta faringoamigdalitis diftérica	Benzilpenicilina procaínica Si alergia a la penicilina, Eritromicina , y referir de urgencia a un centro especializado.

Síntoma(s) dominante(s)	Criterios simples de diagnóstico y clasificación	Tratamiento recomendado
Dolor de oído	Otoscopia normal en el curso de una rinofaringitis aguda Otalgia	Acetaminofen durante 5 días
	Dolor al mover el pabellón de la oreja Otoscopia dolorosa y tímpano normal Otitis externa	Acetaminofen Si furúnculo en el conducto externo del oído: Dicloxacilina durante 5 días.
	Sin otorrea Dolor de oído Otoscopia : tímpano rojo y abombado Otitis media aguda	Acetaminofen Amoxicilina o Trimetropim durante 7 días
	Con otorrea Dolor de oído Otoscopia : tímpano rojo y abombado Otitis media aguda supurada	Amoxicilina o Trimetropim durante 7 días Referir a especialista (Otorrino) si síntomas persisten > 2 semanas
	Tumefacción dolorosa al tacto detrás de la oreja Mastoiditis	Referencia a otorrinolaringólogo
Ronquera y/o voz apagada y/o disfonía	Sin disnea Laringitis aguda	Ibuprofeno durante 3 días
	Con disnea inspiratoria Laringitis edematosa	Referir al Hospital
	Después de la aspiración accidental de un cuerpo extraño Cuerpo extraño	Referir de urgencia a Hospital
	Con tos y fiebre Laringotraqueitis	Acetaminofen Si persiste > 3 días, Amoxicilina o cotrimoxazol durante 7 días